

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP-4-3-70 029886

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE  
N° 114 MARS 1970

ÉDITION GÉNÉRALE

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F

## Pesticides homologués ou en autorisation provisoire de vente au 1<sup>er</sup> Janvier 1970

utilisables contre les ennemis des cultures mentionnés ci-dessous

LES PESTICIDES HOMOLOGUES sont suivis de leur dose d'emploi exprimée, sauf indications contraires, en grammes de matière active par hectolitre d'eau. En ce qui concerne les poudrages, les doses sont indiquées, en grammes de matière active par hectare, pour les cultures annuelles seulement.

LES PESTICIDES EN AUTORISATION PROVISOIRE DE VENTE sont précédés d'un astérisque.

### A. - ARBRES FRUITIERS

#### 1. — RAVAGEURS ANIMAUX

##### Anthronome du pommier :

DDT : 100 g  
lindane : 12 g  
méthoxychlore : 100 g

##### Anthronome du poirier :

DDT : 100 g  
lindane : 12 g  
méthoxychlore : 100 g

##### Carpocapse des pommes et des poires :

arséniate de plomb : 80 g d'arsenic  
azinphos éthyl et méthyl : 40 g  
carbaryl : 75 g  
DDD : 125 g  
DDT (à 50 %) : 125 g  
DDT émulsion : 100 g  
\* dialifor  
diazinon : 30 g  
diéthion : 100 g  
diméthoate : 50 g  
fénitrothion : 50 g  
fenthion : 50 g  
\* formothion  
malathion : 75 g  
méthoxychlore : 125 g  
méthidathion : 30 g  
\* ométhoate  
parathion éthyl : 25 g  
parathion méthyl : 30 g  
\* penthoate  
phosalone : 60 g  
phosmet : 50 g (2)  
phosphamidon : 40 g

##### Tordeuse orientale du pêcher :

azinphos éthyl et méthyl : 40 g  
carbaryl : 120 g  
DDT (à 50 %) : 150 g  
DDT (émulsion) : 120 g  
fénitrothion : 50 g  
méthidathion : 40 g  
mévinphos : 50 g  
parathion éthyl et méthyl : 25 g  
phosalone : 60 g

##### Pucerons :

azinphos éthyl et méthyl : 40 g  
bromophos : 50 g  
carbophénothion : 45 g  
\* dialifor  
diazinon : 25 g  
diéthion : 100 g  
diméthoate : 30 g  
endosulfan : 60 g  
endothion : 50 g  
fénitrothion : 50 g  
fenthion : 75 g  
formothion : 40 g  
isolane : 6 g  
lindane : 30 g  
malathion : 75 g  
\* méthomyl  
méthidathion : 30 g  
mévinphos : 50 g  
\* naled  
nichlorfos : 50 g  
nicotine : 150 g  
\* ométhoate  
oxydéméton méthyl : 25 g  
parathion éthyl : 20 g  
parathion méthyl : 30 g  
phosalone : 60 g  
phosphamidon : 20 g  
\* pirimicarb (puceron vert du pêcher)  
\* promécarbe (2)  
prothoate : 30 g  
vamidothion : 50 g

##### Acariens (1) :

##### esters phosphoriques de contact

azinphos éthyl et méthyl : 40 g  
carbophénothion : 45 g  
\* dialifor  
diazinon : 25 g  
diéthion : 100 g  
malathion : 75 g  
méthidathion : 40 g  
\* naled  
parathion éthyl : 25 g  
parathion méthyl : 30 g

phenkapton : 30 g  
phosalone : 60 g  
prothoate : 30 g

##### esters phosphoriques systémiques

diméthoate : 30 g  
formothion : 40 g  
\* ométhoate  
oxydéméton méthyl : 25 g  
vamidothion : 50 g

##### acaricides spécifiques

*sulfones et sulfonates*  
chlorbenside : 50 g  
chlorofénizon : 50 g  
fénizon : 50 g  
tétradifon : 16 g  
\* tétrasul  
*composés chlorés*  
chlorobenzilate : 25 g (sur arbres fruitiers à pépins seulement)  
\* chloropropylate  
dicofol : 50 g  
*dérivé du benzène*  
binapacryl : 50 g  
*quinoxaline*  
\* chinométhionate (2)  
\* thioquinox  
*formamidine*  
\* chlorphénamidine  
*divers*  
\* chlorphénamidine + formétanate  
\* chlorfensulfide + BCPE  
dioxathion + fénizon : 25 g + 50 g  
\* fénazaflor (pommier seulement)  
\* hydroxyde de tricyclohexylétain

##### Mouche méditerranéenne des fruits :

DDT : 250 g  
diéthylidiphényldichloréthane : 175 g  
diméthoate : 30 g  
\* endothion  
fenthion : 50 g

7403

formothion : 37,5 g  
malathion : 100 g  
méthoxychlore : 250 g  
trichlorfon : 100 g

#### Mouche de la cerise :

DDT : 125 g

diazinon : 30 g  
diméthoate : 30 g  
\* endothion  
fenthion : 50 g  
formothion : 50 g  
oléoparathions : 20 g

#### Mouche de l'olive :

diazinon : 30 g  
diméthoate : 30 g  
endothion : 50 g  
\* fenthion  
formothion : 40 g  
phosphamidon : 30 g

## 2. — MALADIES

#### Tavelures :

bouillies bordelaise et bourguignonne, oxychlorure de cuivre, sulfate basique de cuivre, oxyde cuivreux : 250 g de cuivre métal (dose maximum)  
bouillie sulfocalcique : dose homologuée pour chaque spécialité commerciale

* bénomyl	oxyquinoléate
* captafol	de cuivre : 80 g
captane : 150 g	propinèbe : 200 g
carbatène : 200 g	soufres micronisés : 600 g
dichlone : 50 g	de soufre pur (dose max.)
dithianon : 50 g	* tétrachloroisophtalonitrile
doguadine : 70 g	* thiabendazole
folpel : 100 g (2)	thiocyanodinitro-
mancozèbe : 160 g	benzène : 135 g
manèbe : 160 g	thirame : 200 g
* métiram-zinc	zinèbe : 200 g
	zirame : 180 g

association de zinèbe et de cuivre, association de zirame et de cuivre : doses homologuées pour chaque spécialité commerciale

#### Oïdiums :

binapacryl : 50 g  
bouillie sulfocalcique : dose homologuée pour chaque spécialité commerciale  
chinométhionate : 7,5 g (2)  
dinocap : 25 g  
\* drazoxolon  
soufres fluents en poudrage  
soufres dispersés : 600 g de soufre pur (dose maximum)  
soufres micronisés : 600 g de soufre pur (dose maximum)

#### Cloque du pêcher :

bouillies bordelaise et bourguignonne, oxychlorure de cuivre, oxyde cuivreux, sulfate basique de cuivre : 500 g de cuivre métal

* captafol	ferbame : 175 g
captane : 250 g	thirame : 175 g
	zirame : 175 g

association de zirame et de cuivre : dose homologuée pour chaque spécialité commerciale

## 3. — TRAITEMENT D'HIVER DES ARBRES FRUITIERS

colorants nitrés : 600 g  
\* dinoterbe  
huiles de goudron : 5 l d'huile réelle  
huiles de pétrole : 2,5 l à 3 l d'huile réelle  
huiles jaunes : 1,5 l à 2 l d'huile réelle + 100 à 150 g de DNOC  
oléomalathion : 1 l d'huile réelle + 300 g de malathion  
oléoparathions : 1 l 25 d'huile réelle + 45 g de parathion  
association d'huiles de goudron et de colorants nitrés ; association d'huiles de goudron et d'huiles de pétrole ; association d'huiles de goudron, d'huiles de pétrole et de colorants nitrés ;  
\* association d'huile de goudron, d'huile de pétrole et de fluénétol : doses homologuées pour chaque spécialité commerciale

Remarque : Sur les arbres fruitiers à noyau, les doses d'emploi des huiles de goudron et des huiles de pétrole doivent être réduites de moitié

## B. - VIGNE

### 1. — RAVAGEURS ANIMAUX

#### Tordeuses de la grappe :

arséniate de plomb : 100 à 120 g d'arsenic  
azinphos éthyl et méthyl : 40 g

\* bromophes  
carbaryl : 120 g  
carbaryl : en poudrage  
DDT : 75 g (eudémis seulement)  
DDT : en poudrage (eudémis seulement)

\* dialifor  
diazinon : 25 g  
diazinon : en poudrage  
fénitrothion : 50 g  
malathion : 75 g  
malathion : en poudrage  
\* méthomyl  
méthidathion : 30 g

mévinphos : 50 g  
\* monocrotophos  
parathion éthyl : 20 g  
parathion méthyl : 30 g  
parathion éthyl et méthyl :  
en poudrage  
phosalone : 60 g  
\* phosalone : en poudrage

#### Acarieus (1) :

##### esters phosphoriques de contact

azinphos éthyl et méthyl : 40 g  
carbophénothion : 30 g

\* dialifor  
diazinon : 25 g  
diéthion : 75 g  
malathion : 75 g  
méthidathion : 40 g

parathion éthyl : 25 g  
parathion méthyl : 30 g  
phenkapton : 20 g  
phosalone : 60 g  
\* phosalone : en poudrage  
prothoate : 30 g

##### esters phosphoriques systémiques

diméthoate : 30 g  
formothion : 40 g  
\* monocrotophos

\* ométhoate  
oxydéméton méthyl : 25 g  
vamidothion : 50 g

##### acaricides spécifiques

sulfones et sulfonates  
chlorbenside : 50 g  
chlorofénizon : 50 g  
fénizon : 50 g

tétradifon : 16 g  
\* tétrasul

composés chlorés  
chlorobenzilate : 25 g  
\* chloropropylate

dicofol : 50 g  
dicofol : en poudrage

##### quinoxaline

\* thioquinox

##### formamidine

\* chlorphénamidine

##### divers

\* chlorfensulfide + BCPE  
dioxathion + fénizon : 25 g + 50 g  
\* hydroxyde de tricyclohexylétain

## 2. — MALADIES

#### Mildiou :

bouillies bordelaise et bourguignonne, sulfate basique de cuivre, oxychlorure de cuivre, oxyde cuivreux : 500 g de cuivre métal

\* captafol  
captane : 175 g  
carbatène : 300 g (raisin de table)  
\* dichlofluamide  
folpel : 150 g (2)  
folpel : en poudrage

mancozèbe : 280 g  
manèbe : 280 g  
\* propinèbe  
zinèbe : 250 g

association de carbatène et de cuivre, \* association de dichlofluamide et de cuivre, association de mancozèbe et de cuivre, association de manèbe et de cuivre, \* association de métiram-zinc et de cuivre, \* association de propinèbe et de cuivre, association de zinèbe et de cuivre : doses homologuées pour chaque spécialité commerciale

hydroxyde de cuivre, mancozèbe, manèbe, oxychlorure de cuivre, sulfate basique de cuivre en traitements complémentaires du mildiou de la grappe en poudrage



### Black-rot :

bouillies bordelaise et bourguignonne, sulfate basique de cuivre, oxychlorure de cuivre, oxyde cuivreux : 500 g de cuivre métal  
captafol : 180 g  
captane : 175 g  
folpel : 175 g (2)

mancozèbe : 280 g  
manèbe : 280 g  
\* propinèbe  
zinèbe : 250 g

association de carbatène et de cuivre, \* association de mancozèbe et de cuivre, \* association de manèbe et de cuivre, \* association de propinèbe et de cuivre, association de zinèbe et de cuivre : doses homologuées pour chaque spécialité commerciale

### Pourriture grise :

- \* benomyl
- \* captafol (raisin de table)
- \* captane
- \* dichlofluanide
- \* folpel (pulvérisation et poudrage) (2)
- \* thirame
- \* association de dichlofluanide et de cuivre

### Oïdium :

dinocap : 30 g  
dinocap en poudrage  
soufres dispersés : 1 000 g de soufre pur  
soufres micronisés : 1 000 g de soufre pur  
soufres mouillables ordinaires (à ajouter à une bouillie bordelaise en raison de l'insuffisance de la tenue en suspension s'ils sont utilisés seuls) : 2 000 g de soufre pur  
soufres : en poudrage

## 3. — TRAITEMENT D'HIVER DE LA VIGNE

### Cochenilles :

huiles de goudron, huiles jaunes, oléomalathion, oléoparathions : voir les doses homologuées pour le traitement d'hiver des arbres fruitiers

### Excoriose :

arsénite de soude : 1 250 g d'arsenic  
colorants nitrés : 600 g  
huiles jaunes : 1,5 l à 2 l d'huile réelle + 100 à 150 g de D N O C

### Esca :

arsénite de soude : 1 250 g d'arsenic

## C. - POMME DE TERRE

### Doryphore :

arséniate de chaux : 140 g d'arsenic  
arséniate de plomb : 170 g d'arsenic  
azinphos éthyl et méthyl : 40 g

carbaryl : 75 g  
carbaryl : 1 000 g  
en poudrage

### \* chlorfenvinphos

DDD : 75 g  
DDT : 50 à 80 g  
DDT : 1 500 g  
en poudrage  
endosulfan : 35 g  
endosulfan : 600 g  
en poudrage  
lindane : 8 g

lindane : 100 g  
en poudrage  
méthidathion : 30 g  
\* ométhoate  
phosalone : 60 g  
phosalone : 800 g  
en poudrage  
phosmet : 50 g (2)  
phosphamidon : 30 g  
promécarbe : 75 g (2)  
roténone : 10 g  
roténone : 100 g  
en poudrage

toxaphène et polychlorocamphane : 150 g  
toxaphène et polychlorocamphane : 1.500 g en poudrage

### Mildiou :

bouillies bordelaise et bourguignonne : 500 g de cuivre métal  
captafol : 160 g  
folpel : 150 g (2)  
mancozèbe : 160 g  
oxychlorure de cuivre : 500 g de cuivre métal  
oxychlorure de cuivre : en poudrage  
oxyde cuivreux : 500 g de cuivre métal  
oxyde cuivreux : en poudrage

manèbe : 160 g  
métirame de zinc : 200 g

propinèbe : 200 g

sulfate basique de cuivre : 500 g de cuivre métal

sulfate basique de cuivre : en poudrage

### \* tétrachloroisophtalonitrile

zinèbe : 200 g

association de carbatène et de cuivre, association de manèbe et de cuivre, \* association de propinèbe et de cuivre, association de zinèbe et de cuivre, association de zirame et de cuivre : doses homologuées pour chaque spécialité commerciale  
mancozèbe, manèbe (spécialités à 6 % de matière active minimum) : 1 800 g en traitements complémentaires en poudrage

## D. - COLZA

(en grammes de matière active à l'ha)

### Petite altise du colza :

DDD et DDT : 600 g en pulvérisation  
800 g en poudrage

### \* diazinon : pulvérisation et poudrage

dieldrine : 200 g en pulvérisation  
280 g en poudrage

endosulfan : 150 g en pulvérisation

200 g en poudrage

lindane : 120 g en pulvérisation

160 g en poudrage

malathion : 500 g en pulvérisation

700 g en poudrage

méthidathion : 200 g en pulvérisation

parathions : 130 g en pulvérisation

180 g en poudrage

toxaphène et polychlorocamphane : 1 700 g en pulvérisation

2 300 g en poudrage

### Grosse altise, méligèthe :

DDD et DDT : 900 g en pulvérisation  
1 200 g en poudrage

### \* diazinon : pulvérisation et poudrage

dieldrine : 300 g en pulvérisation

400 g en poudrage

endosulfan : 250 g en pulvérisation

300 g en poudrage

lindane : 200 g en pulvérisation

275 g en poudrage

malathion : 700 g en pulvérisation

900 g en poudrage

méthidathion : 250 g en pulvérisation

parathions : 200 g en pulvérisation

275 g en poudrage

phosalone : 1 000 g en pulvérisation

### \* promécarbe (méligèthe seulement) (2)

toxaphène et polychlorocamphane : 2 250 g en pulvérisation  
3 000 g en poudrage

### Charançon des tiges :

### \* diazinon : pulvérisation et poudrage

dieldrine : 500 g en pulvérisation

700 g en poudrage

endosulfan : 400 g en pulvérisation

500 g en poudrage

lindane : 300 g en pulvérisation

400 g en poudrage

méthidathion : 300 g en pulvérisation

parathions : 300 g en pulvérisation

400 g en poudrage

toxaphène et polychlorocamphane : 4 000 g en pulvérisation

5 000 g en poudrage

### Charançon des siliques :

### \* diazinon : pulvérisation et poudrage

dieldrine : 900 g en pulvérisation

1 200 g en poudrage

endosulfan : 600 g en pulvérisation

800 g en poudrage

lindane : 500 g en pulvérisation

600 g en poudrage

méthidathion : 500 g en pulvérisation

parathions : 500 g en pulvérisation

600 g en poudrage

phosalone : 1 200 g en pulvérisation

toxaphène et polychlorocamphane : 4 000 g en pulvérisation

5 000 g en poudrage

## E. - BETTERAVE

(en grammes de matière active à l'ha)

### Pucerons :

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| * dialifor  |                           |
| diméthoate : 500 g                                    |                           |
| disulfoton : 1 000 g (granulés dans la raie du semis) |                           |
| * endosulfan  | oxydéméton méthyl : 200 g |
| endothion : 500 g                                     | parathion éthyl : 200 g   |
| formothion : 500 g                                    | parathion méthyl : 300 g  |
| * isolane   | phosphamidon : 300 g      |
| lindane : 300 g                                       | vamidothion : 500 g       |
| mévinphos : 350 g                                     |                           |

### Mouche de la betterave :

- |                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| azinphos éthyl et méthyl : 250 g |                      |
| diazinon : 150 g                 | lindane : 300 g      |
| dieldrine : 400 g                | mévinphos : 300 g    |
| diméthoate : 250 g               | parathions : 150 g   |
| endothion : 600 g                | * phosalone          |
| fenthion : 500 g                 | phosphamidon : 200 g |
| formothion : 250 g               | toxaphène : 1 500 g  |
| heptachlore : 1 000 g            | trichlorfon : 300 g  |

## F. - MAIS

(en grammes de matière active à l'ha)

### Pyrale :

- DDT (granulés) : 1 500 g
- \* fénitrothion
- heptachlore : 1 500 g

## G. - CULTURES LÉGUMIÈRES

### Pucerons :

- |                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| azinphos éthyl et méthyl : 40 g | malathion : 75 g        |
| bromophos : 50 g                | malathion : 1 000 g     |
| carbophénothion : 45 g          | en poudrage             |
| * dialifor                      | * méthidathion          |
| diazinon : 25 g                 | mévinphos : 35 g        |
| diazinon : 350 g                | naled : 100 g           |
| en poudrage                     | nichlorfos : 50 g       |
| dichlorvos : 100 g              | nicotine : 150 g        |
| diéthion : 75 g                 | * ométhoate             |
| diméthoate : 30 g               | parathion éthyl : 20 g  |
| endosulfan : 60 g               | parathion méthyl : 30 g |
| * endothion                     | parathions : 250 g      |
| fénitrothion : 50 g             | en poudrage             |
| fenthion : 75 g                 | phosalone : 60 g        |
| formothion : 40 g               | prothoate : 30 g        |
| isolane : 6 g                   | pyréthrines             |
| lindane : 30 g                  | synergisées : 12 g      |
| lindane : 400 g                 | roténone : 20 g         |
| en poudrage                     |                         |

### Acaris (1) :

#### esters phosphoriques de contact

- |                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| azinphos éthyl et méthyl : 40 g | malathion : 75 g        |
| carbophénothion : 45 g          | méthidathion : 40 g     |
| * dialifor                      | * naled                 |
| diazinon : 25 g                 | parathion éthyl : 25 g  |
| diazinon : 360 g                | parathion méthyl : 30 g |
| en poudrage                     | phenkapton : 20 g       |
| diéthion : 100 g                | phosalone : 60 g        |
|                                 | prothoate : 30 g        |

### esters phosphoriques systémiques

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| diméthoate : 30 g | mévinphos : 35 g |
| formothion : 40 g | * ométhoate      |

### acaricides spécifiques

- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <i>sulfones et sulfonates</i>      |                   |
| chlorbenseide : 50 g               | tétradifon : 16 g |
| chlorofénizon : 50 g               | * tétrasul        |
| fénizon : 50 g                     |                   |
| <i>composés chlorés</i>            |                   |
| chlorobenzilate : 25 g             | dicofol : 700 g   |
| * chloropropylate                  | en poudrage       |
| dicofol : 50 g                     |                   |
| <i>dérivés du benzène</i>          |                   |
| binapacryl : 50 g                  |                   |
| <i>quinoxaline</i>                 |                   |
| * chinométhionate (2)              |                   |
| thioquinox : 40 g                  |                   |
| <i>formamidine</i>                 |                   |
| * chlorphénamidine                 |                   |
| <i>divers</i>                      |                   |
| * chlorfensulfide + BCPE           |                   |
| dioxathion + fénizon : 25 g + 50 g |                   |

### Mouche de l'asperge :

(aspergeraies en voie d'établissement)

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| diazinon : 30 g   | endothion : 50 g  |
| diméthoate : 30 g | formothion : 50 g |

### Mouche de l'endive :

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| diméthoate : 30 g | formothion : 37,5 g |
|-------------------|---------------------|

### Mouche de l'oignon :

- aldrine : 15 g/kg (traitement des semences)
- \* carbophénothion (traitement du sol — pulvérisation)
- \* chlorfenvinphos (traitement du sol — pulvérisation et granulés)
- diazinon (traitement du sol — granulés) : 800 g/ha
- dieldrine : 15 g/kg (traitement des semences)
- diéthion : 60 g/kg (traitement des semences)
- diéthion (traitement du sol — pulvérisation) : 6.000 g/ha
- \* dichlofenthion (traitement du sol — granulés)
- \* fonofos (traitement du sol)
- \* trichloronate (traitement des semences)
- \* trichloronate (trempage des plants)
- \* trichloronate (traitement du sol — granulés et pulvérisation)

### Mouche de la carotte :

- \* carbophénothion (traitement du sol — pulvérisation)
- \* chlorfenvinphos (traitement du sol — pulvérisation et granulés)
- diazinon (traitement du sol — granulés) : 8.000 g/ha
- diéthion (traitement du sol — pulvérisation) : 6.000 g/ha
- \* dichlofenthion (traitement du sol — granulés)
- \* fonofos (traitement du sol)
- \* trichloronate (traitement des semences)
- \* trichloronate (traitement du sol — granulés et pulvérisation)

### Oïdiums des cultures légumières :

- \* benomyl
- chinométhionate : 7,5 g (2)
- dinocap : 25 g
- dinocap : en poudrage
- \* drazoxolon
- soufres fluents (poudrage)
- soufre micronisé : 600 g de soufre pur (dose maximum)
- \* tétrachloroisophtalonitrile
- \* thiabendazole

(1) Les acaricides ont été divisés en groupes chimiques, pour permettre aux utilisateurs de varier leur choix, afin d'éviter d'éventuels phénomènes d'accoutumance.

(2) folpel ex phaltane - phosmet ex imidithion - promécarbe ex minacide - chinométhionate ex oxythioquinox.

(Listes établies par le Service Central de la Protection des Végétaux)

N.-B. — Cette note devra être soigneusement conservée, les avis s'y reporteront fréquemment au cours de l'année